**PENETAPAN MUTU EKSTRAK ETANOL KULIT BATANG BANYURU
(*Pterospermum celebicum*, Miq.) SEBAGAI BAHAN BAKU SEDIAAN HERBAL
TERSTANDAR**

Asnah Marzuki¹, Rahim², Rita²

¹ *Laboratorium Kimia Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin,
Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea, Makassar*

² *Laboratorium Farmakognosi-Fitokimia, Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin,
Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea, Makassar*

*Email: asnah_marzuki@yahoo.com

ABSTRACT

The research of the determination of quality Banyuru (*Pterospermum celebicum*, Miq) bark ethanol extract, comes from the Bantaeng, Malino and Pare-Pare, a specific plant and has been used as a traditional plant in South Sulawesi. This research aims to make as a raw material preparation standardized herbal extracts, using quality standards as a parameter. Standardized herbal extracts which include extracts organoleptic testing, with the results showing all EKBB dark brown extract, astringent taste, textured powder and has a characteristic odor, assay compound EKBB extract water soluble Bantaeng origin 13.48% and the concentration of substances soluble ethanol 1.84%. Malino origin extracts compound content of water-soluble compound content is 14.89% and 3.61% soluble ethanol. EKBB compound content origin Pare-Pare 14.76% water soluble and ethanol soluble compound content is 2.48%. Profile of chemical compounds each extract is done with methods that extract EKBB KLT- Densitofotometrik shows that the area Bantaeng, Malino and Pare-Pare contain flavonoid compounds, flavonoid compounds characterized by staining blue on spraying with reagent sitroborat. The average total flavonoid compounds Bantaeng EKBB 1.10%, 1.06% and Malino Pare-Pare 1.05% calculated as quercetin.

Keywords: Banyuru (*Pterospermum celebicum*, Miq), Quality, Bark, Ethanol Extract.

ABSTRAK

Penelitian penetapan mutu ekstrak etanol kulit batang Banyuru (*Pterospermum celebicum*, Miq), telah dilakukan, yang berasal dari daerah Bantaeng, Malino dan Pare-Pare, yang merupakan tanaman spesifik. digunakan sebagai tanaman tradisional Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan menjadikan sebagai bahan baku ekstrak sediaan herbal terstandar, menggunakan standar mutu sebagai parameter. Ekstrak herbal terstandar yang meliputi pengujian organoleptik ekstrak, dengan hasil menunjukkan semua ekstrak EKBB berwarna coklat tua, rasa sepat, bertekstur serbuk dan memiliki bau yang khas, pengujian kadar senyawa ekstrak EKBB asal Bantaeng yang larut air 13,48% dan kadar senyawa yang larut etanol 1,84%. Kadar senyawa ekstrak asal Malino yang larut air 14,89% dan kadar senyawa yang larut etanol 3,61%. Kadar senyawa EKBB asal Pare-Pare yang larut air 14,76% dan kadar senyawa yang larut etanol 2,48%. Profil senyawa kimia masing-masing ekstrak dilakukan dengan metode KLT- Densitofotometrik yaitu ekstrak

EKBB menunjukkan bahwa daerah Bantaeng, Malino dan Pare-Pare mengandung senyawa golongan flavonoid, senyawa golongan flavonoid ditandai dengan bercak noda berwarna biru pada penyemprotan dengan reagen sitroborat. Total rata-rata kandungan flavonoid senyawa EKBB Bantaeng 1,10%, Malino 1,06% dan Pare-Pare 1,05% dihitung sebagai kuersetin.

Kata Kunci : Banyuru (*Pterospermum celebicum*, Miq), Standar mutu, Kulit Batang, Ekstrak Etanol.

PENDAHULUAN

Tumbuhan tropis mempunyai kemampuan merekayasa beraneka ragam senyawa kimia yang mempunyai berbagai bioaktivitas yang menarik dan merupakan salah satu akibat mekanisme pertahanan diri terhadap ancaman lingkungan (1), karena pada umumnya hidup di bawah kondisi lingkungan yang keras, baik faktor iklim maupun gangguan dari herbivora, serangga, dan hama penyakit. Untuk itu, tumbuhan tropis dapat menghasilkan senyawa-senyawa kimia alami yang bersifat pestisida, insektisida, antifungi, dan sitotoksik. Tumbuhan familia Sterculiaceae telah berhasil diisolasi beberapa senyawa kimia dan berbagai golongan antara lain alkaloid, flavanoid, polifenol, triterpenoid dan tanin yang potensial sebagai antimikroba, antitumor, dan pestisida (2, 3). Spesies Sterculiaceae telah digunakan dalam pengobatan tradisional, seperti pada spesies yang telah diskriminasi yaitu *Cola Greenwayi*, *Cola natalensis*, *Dombeya burgessiae*, *Dombeya cymosa* dan *Hermannia depressa*, diperoleh ekstrak yang mengandung alkaloid, cardiac glikosida, sianogenik glikosida, saponin dan tannin. Ekstraknya telah diskriminasi untuk aktivitas anti inflamasi dan antibakteri dengan menggunakan penentuan terhadap penghambatan siklus oksigenase – 1 (COX -1) dari penentuan inhibisi dan penentuan mikrodilusi antibakteri. Penetapan Bioautografi menggunakan *Staphylococcus aureus* yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan komponen antibakteri, di isolasi dan diidentifikasi sebagai asam lemak (4).

Flavanoid merupakan senyawa polifenol, sifatnya sebagai senyawa fenol yaitu agak asam dan dapat larut dalam basa, dan karena merupakan senyawa polihidroksi (gugus hidroksil) maka juga bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut polar seperti etanol, aseton, air, butanol, dimetil sulfoksida. Disamping itu dengan adanya gugus glikosida yang terikat pada gugus flavonoid sehingga cenderung menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air. (5). Salah satu genusnya telah dilaporkan yaitu tumbuhan Banyuru (*Pterospermum celebicum*, Miq) dan telah diidentifikasi pada kulit batangnya mengandung senyawa polifenol, flavonoid, dan saponin, yang sangat banyak, sehingga kulit batang jenis tumbuhan ini berpotensi untuk berbagai kemungkinan bahan obat, tannin, polifenol dan flavanoid, senyawa-senyawa metabolit sekunder ini memiliki bioaktivitas menarik dan mempunyai efek terapeutik yang tepat juga telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional secara luas oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dan mempunyai khasiat sebagai obat yang mampu mengobati penyakit disentri, luka pada gusi dan gatal pada kulit dan sebagai antiseptik, walaupun kayunya digunakan sebagai bahan bangunan dan kulit batang digunakan sebagai pewarna (6). Pengembangan obat tradisional menjadi ekstrak yang terstandar atau fitofarmaka, dengan melalui tahap standarisasi untuk menjamin kejelasan dan kesamaan bahan yang terkandung di dalam sediaan dari bahan alam sehingga diharapkan mempunyai efek farmakologi yang tetap dari waktu ke waktu.

Standarisasi obat herbal merupakan rangkaian proses yang melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan kandungan senyawa ekstrak, analisis fisik dan mikrobiologi berdasarkan kriteria umum keamanan (toksikologi) terhadap suatu ekstrak alam (tumbuhan obat) (7). Biasanya obat tradisional dibuat dalam bentuk ekstrak karena

tanaman obat tidak lagi praktis jika digunakan dalam bentuk bahan utuh (simplicia). Ekstrak tersebut bisa dalam bentuk ekstrak kering, ekstrak kental, dan ekstrak cair yang proses pembuatannya disesuaikan dengan bahan aktif yang dikandung serta maksud penggunaannya, apakah dibuat menjadi sediaan dalam bentuk kapsul, tablet, cairan obat dalam, pil, dan lain-lain (8).

Standardisasi obat herbal meliputi dua aspek, yaitu aspek parameter spesifik dan aspek parameter non spesifik. Aspek parameter spesifik yakni terutama yang berkaitan dengan senyawa atau golongan senyawa yang mempengaruhi aktivitas farmakologis. Analisis kimia yang melibatkan ditujukan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif. Aspek parameter non spesifik berfokus pada aspek kimia, mikrobiologi dan fisis yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas, misalnya pengaruh lingkungan tempat tumbuh, adanya pencemar logam berat, pestisida di dalam air dan tanah, kontaminasi selama penanganan pasca panen, peralatan yang digunakan selama proses akan mempengaruhi ada tidaknya dan jumlah bakteri, jamur, pestisida, dan logam berat di dalam ekstrak jika terakumulasi dalam jangka panjang (9).

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penentuan standardisasi spesifik ekstrak kulit batang banyuru (*Pterospermum Celebicum*, Miq.), agar khasiat dan stabilitasnya dapat terjamin saat dijadikan sebagai bahan obat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh nilai standarisasi sebagai parameter mutu serta penentuan aktivitasnya terhadap penyakit infeksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Uraian Umum Banyuru (*Pterospermum Celebicum* Miq).

Klasifikasi tumbuhan (6).

Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Sub kelas : Sympetalae
Bangsa : Malvales
Suku : Sterculiaceae
Marga : *Pterospermum*
Spesies : *Pterospermum celebicum* Miq

Tumbuhan *Pterospermum Celebicum*, tumbuh tersebar di hutan–hutan primer atau tumbuh melimpah secara lokal di hutan-hutan sekunder dan terutama pada pinggir sungai, pada tanah aluvial, tumbuh hingga mencapai ketinggian 1400 m dari permukaan laut. Merupakan salah satu tumbuhan tropis yang spesifik di Sulawesi Selatan, berupa pohon berukuran sedang hingga besar, tingginya mencapai 45 meter dan berdiameter hingga 100-120 cm. Mempunyai daun berwarna hampir coklat kemerahan pada bagian permukaan bawah dan dilapisi stipula. Permukaan kulit batang bersisik dan mempunyai bunga dan buah. Genus *Pterospermum* mempunyai 40 spesies, terdistribusi di India, Burma, China selatan, Thailand dan seluruh wilayah Malaysia. Tumbuhan Sterculiaceae terdiri dari 58 genus dan sekitar 700 spesies. Berdasarkan laporan ASEAN *Regional Centre for Biodiversity Conservation* (ARCBC), dalam *Checklist of Medicinal Plants In Southeast Asia*, tumbuhan *Pterospermum Celebicum* terdistribusi di Indonesia dengan nama Bayur, khususnya di Sulawesi selatan oleh Departemen Kehutanan dikenal dengan nama Banyuru. Bagian kayunya digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kayu lapis, furnitur,

perkapalan, jembatan, pulp dan kertas. Daun dan kulit batang banyak mengandung tanin, yang berkhasiat mengobati gatal-gatal, lobang pada gigi dan sebagai obat disentri.

Menurut Heyne (10), daun *Pterospermum celebicum*, Miq, dapat digunakan sebagai pewarna dan pemakaiannya sebagai obat tradisional sudah tersebar di seluruh Nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan. Para pemakai tumbuhan ini sebagai obat tradisional umumnya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dan kebanyakan digunakan sebagai obat alternatif apabila obat modern tidak lagi efektif.

Dari gambaran senyawa metabolit secara umum pada tumbuhan tingkat tinggi yang mengandung senyawa alami, memiliki potensi untuk mensintesis beberapa senyawa metabolit sekunder (1).

Standardisasi dalam kefarmasian tidak lain adalah serangkaian parameter, prosedur dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi syarat standard (kimia, biologi dan farmasi), termasuk jaminan (batas-batas) stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya.

Standardisasi obat herbal meliputi dua aspek, yaitu aspek parameter spesifik dan aspek parameter non spesifik. Aspek parameter spesifik yakni terutama yang berkaitan dengan senyawa atau golongan senyawa yang mempengaruhi aktivitas farmakologis. Analisis kimia yang melibatkan ditujukan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif. Aspek parameter non spesifik berfokus pada aspek kimia, mikrobiologi dan fisis yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas, misalnya pengaruh lingkungan tempat tumbuh, adanya pencemar logam berat, pestisida di dalam air dan tanah, kontaminasi selama penanganan pasca panen, peralatan yang digunakan selama proses akan mempengaruhi ada tidaknya dan jumlah bakteri, jamur, pestisida, dan logam berat di dalam ekstrak jika terakumulasi dalam jangka panjang. (9).

Obat tradisional dibuat dalam bentuk ekstrak karena tanaman obat tidak lagi praktis jika digunakan dalam bentuk bahan utuh (simplicia). Ekstrak tersebut bisa dalam bentuk ekstrak kering, ekstrak kental, dan ekstrak cair yang proses pembuatannya disesuaikan dengan bahan aktif yang dikandung serta maksud penggunaannya, apakah dibuat menjadi sediaan dalam bentuk kapsul, tablet, cairan obat dalam, pil, dan lain-lain .

METODE PENELITIAN

Alat Dan Bahan

Alat-alat yang digunakan adalah bejana maserasi, orong pisah, labu bersumbat kaca, gelas ukur, pipet tetes, plat tetes, Lampu UV 254 nm dan 366 nm, Chamber (CAMAG), mikropipet, spektrofotometri UV-VIS (Hewlett-packard®), KLT-densitometer ,TLC scanner.

Bahan-bahan yang digunakan adalah alumunium foil, AlCl₃, citro borax, H₂SO₄, kulit kayu batang, banyuru, etanol 70 %, kloroform, kuersetin (Sigma®), lempeng KLT (silica gel 60 GF₂₅₄), Natrium asetat.

Penyiapan Sampel

Sampel diambil dari daerah Malino. Kulit batang dipisahkan dari batangnya, kemudian dipotong-potong, dikeringkan dalam oven simplicia, selanjutnya dihaluskan dan dilakukan maserasi memakai pelarut etanol 70%.

Penyiapan Ekstrak

Ekstrak dibuat dengan cara maserasi terhadap serbuk kulit kayu banyuru (*Pterospermum celebicum* Miq.) etanol 70% LP direndam selama 3 hari. Ekstrak yang diperoleh

dipisahkan selanjutnya dilakukan remaserasi sebanyak dua kali dengan cara yang sama. Ekstrak dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya dengan menggunakan rotavapor dan diangin-anginkan sampai diperoleh ekstrak kering

Pemeriksaan organoleptik Ekstrak

Organoleptik bertujuan sebagai pengenalan awal yang seobyektif mungkin dari ekstrak tanaman meliputi bentuk, bau dan rasa (11). Seperti Tekstur, bau, warna dan rasa.

Penetapan Kadar Senyawa yang larut dalam air.

Sebanyak 5 g ekstrak dimaserasi dengan 100 ml air-kloroform selama 24 jam, menggunakan labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok selama 6 jam pertama dan kemudian dibiarkan selama 18 jam, kemudian disaring. 20 ml filtrat diuapkan hingga kering dalam cawan penguap, residu dipanaskan pada suhu 105°C hingga bobot tetap. Dihitung kadar dalam persen senyawa yang larut dalam air terhadap berat ekstrak awal. (7)

Penetapan Kadar Senyawa yang larut dalam etanol

Sejumlah 5 g ekstrak dimaserasi selama 24 jam dengan 100 ml etanol 96% menggunakan labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok selama 6 jam pertama dan kemudian dibiarkan selama 18 jam. Disaring cepat dengan menghindari penguapan etanol, kemudian diuapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan penguap yang telah ditera, residu dipanaskan pada suhu 105°C hingga bobot tetap. Dihitung kadar dalam persen senyawa yang larut dalam etanol terhadap berat ekstrak awal. (7)

Kadar Profil Senyawa Kimia dengan KLT

Larutan uji KLT : Ekstrak etanol 70% dilarutkan dengan etanol dan dicukupkan volumenya hingga 0,5 ml, sehingga larutan stok sampel 20 mg/0,5 ml.

Prosedur KLT : Untuk melihat spot-spot yang tampak pada masing-masing ekstrak kulit batang kayu banyuru *Pterospermum celebicum* Miq. Dilakukan dengan KLT dengan cara : masing-masing larutan sampel dan larutan pembanding (katekin 1% etanol P) ditotolkan pada lempeng KLT yang sama dengan ukuran 10x10 cm menggunakan mikropipet sebanyak 5.0 µL, 1 cm dari dasar lempeng, lalu dibiarkan beberapa saat hingga kering dan dimasukkan ke dalam *chamber* (bejana kromatografi) yang sudah jenuh dengan cairan pengelusi (fase gerak) Kloroform-metanol 8:2. Elusi dilakukan sampai batas 0,5 cm dan tepi atas lempeng. Lempeng dikeluarkan dari bejana dan diangin-anginkan hingga cairan pengelusnya menguap. Dideteksi bercak pada sinar UV 254 dan 366 nm (11).

Penetapan Kadar Flavanoid Total dari Ekstrak Etanol Kulit Kayu Banyuru ditentukan dengan Metode Chang

a. Pembuatan Larutan Baku Kuersetin

Ditimbang seksama 10 mg kuersetin kemudian dilarutkan dalam etanol 80% dan dicukupkan volumenya hingga 10 ml. Sehingga diperoleh larutan stok. Dari larutan stok ini dipipet masing-masing 10 µl, 20 µl, 30 µl, 40 µl, 50 µl kemudian ditambah 1 ml etanol 95%, dan 0,1 ml AlCl₃ 10% serta 0,1 ml kalium asetat. Dicukupkan volumenya hingga 5 ml dengan air suling sehingga diperoleh konsentrasi masing-masing 2, 4, 6, 8, dan 10 µg/ml. Selanjutnya diinkubasi selama 25 menit pada suhu kamar. Diukur absorbannya pada panjang gelombang maksimum.

b. Penentuan Flavanoid Total

Ditimbang seksama kemudian dilarutkan dalam etanol 80% dan dicukupkan volumenya hingga 10 ml, larutan ini diambil 2,5 ml dan dimasukkan dalam labu tentukur 5 ml, ditambahkan 0,1 ml AlCl_3 10% serta 0,1 ml kalium asetat 1 M, dan dicukupkan volumenya dengan air suling. Diukur absorbannya pada panjang gelombang maksimum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Organoleptik Ekstrak etanol kulit batang Banyuru (EKBB) daerah Bantaeng, Malino dan Pare-Pare,

Asal	Penyari	Parameter Organoleptik			
		Bau	Warna	Tekstur	Rasa
Bantaeng	Etanol	Spesifik	Coklat tua	Kering	Pahit, Sepat
Malino	Etanol	Spesifik	Coklat tua	Kering	Pahit, sepat
Pare-Pare	Etanol	Spesifik	Coklat tua	Kering	Pahit, sepat

Tabel 2. Hasil perhitungan rendamen (%) ekstrak etanol kulit batang Banyuru daerah Bantaeng, Malino dan Pare-Pare, dengan menggunakan pelarut air.

Asal	Penyari	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak Etanol (g)	Rendemen (%)
Bantaeng	Etanol	495	59,45	12,01
Malino	Etanol	500	61,601	12,32
Pare-Pare	Etanol	480	53,85	11,22

Tabel 3. Hasil Pengujian kadar air dan kadar abu total dari ekstrak etanol kulit batang Banyuru.

Ekstrak Etanol	Persentase	
	Kadar air total	Kadar Abu total
Bantaeng	$0,0021 \pm 0,0004$	$0,0201 \pm 0,0004$
Malino	$0,0020 \pm 0,0004$	$0,0210 \pm 0,0004$
Pare-Pare	$0,0019 \pm 0,0004$	$0,0191 \pm 0,0004$

Tabel 4. Hasil pengujian kadar senyawa ekstrak etanol kulit batang banyuru daerah Bantaeng, Malino dan Pare-Pare, larut etanol.

Sampel	Persentase Kadar Senyawa Larut etanol					
	Ekstrak (gram)	Berat Cawan (gram)	Berat Akhir cawan (gram)	Berat Larut Etanol (gram)	Persentase (%)	Rentang Rata-rata (%)
Bantaeng	1.001	22.625	23.626	0.13	1.299	$13,482 \pm 0,036$
	1.002	22.400	23.402	0.135	1.347	
	1.001	22.360	23.3609	0.014	1.399	
Malino	1,000	22.360	23.360	0,147	1.470	$14,895 \pm 0,040$
	1.001	22.361	23.3614	0.150	1.499	
	1,001	22.350	23.350	0.150	1.500	
Pare-Pare	1.003	20.244	21.247	0.147	1.466	$14,762 \pm 0.007$
	0.999	20.245	21.244	0.0148	1.481	
	0.999	20.245	21.244	0.148	1.482	

Tabel 5. Hasil pengujian kadar senyawa ekstrak etanol kulit batang Banyuru daerah Bantaeng, Malino dan Pare-Pare, larut air.

Sampel	Persentase Kadar Senyawa Larut Air					Rentang Rata-rata (%)
	Ekstrak (gram)	Berat Cawan (gram)	Berat Akhir cawan (gram)	Berat Larut Air (gram)	Persentase (%)	
Bantaeng	1,0008	23,771	24,772	0,018	1,798561	1,842±0,051
	1,0007	23,951	24,952	0,018	1,808734	
	1,0008	23,961	24,962	0,019	1,918465	
Malino	1,0010	23,770	24,771	0,037	3,696304	3,613±0,078
	1,0012	23,771	24,772	0,036	3,645625	
	1,0010	23,780	24,781	0,035	3,496503	
Pare-Pare	1,0009	23,260	24,261	0,025	2,497752	2,485±0,031
	1,0008	23,261	24,261	0,024	2,43805	
	1,0005	23,261	24,261	0,025	2,518741

Gambar 1 Hasil Foto KLT pada sinar UV dengan panjang 366 nm gelombang 200-800 nm, Cairan pengembang yang digunakan adalah butanol:asam asetat:air (4:1:5). a.) Ekstrak Etanol Banyuru Bantaeng. b.) Ekstrak Etanol Banyuru Malino c.) Ekstrak Etanol Banyuru Pare-Pare.

Gambar 2. Senyawa Kimia Plat KLT Dengan menggunakan KLT- Desitofotometer pada sinar UV dengan panjang gelombang 200-800 nm, Cairan pengembang yang digunakan adalah butanol:asam asetat:air (4:1:5). a.) Ekstrak Etanol Banyuru Bantaeng. b.) Ekstrak Etanol Banyuru Malino c.) Ekstrak Ekstrak Etanol Banyuru Pare-Pare.

Pembahasan

Pada saat disemprot dengan sitroborat akan terjadi ikatan kompleks pada gugus orto-hidroksi dan menimbulkan pergeseran khas pada pita panjang gelombang yang lebih

besar yang berguna pada analisis beberapa golongan flavonoid. Nilai Rf ekstrak tidak jauh berbeda dengan noda, sehingga dapat dinyatakan bahwa ekstrak etanol memiliki kandungan senyawa flavonoid, yang dapat dilihat pada gambar 1 sampai 5

Gambar 3. Hasil profil kromatogram ekstrak etanol Kulit Batang Banyuru Bantaeng pada panjang gelombang 254 nm. Fase gerak metanol:air (2:1). Fase diam Oktadesil silika (ODS).

Gambar 4.. Hasil profil kromatogram ekstrak etanol Kulit Batang Banyuru Malino pada panjang gelombang 254 nm. Fase gerak metanol:air (2:1). Fase diam Oktadesil silika (ODS).

Gambar 5. Hasil profil kromatogram ekstrak etanol Kulit Batang Banyuru Pare-Pare pada panjang gelombang 254 nm. Fase gerak metanol:air (2:1). Fase diam Oktadesil silika (ODS).

Kadar air ekstrak kering <5%, ekstrak kental 5-30%, dan ekstrak cair >30%. Tujuan dari parameter susut pengeringan adalah memberikan batasan maksimal (rentang) tentang

besarnya air ataupun pelarut lain yang hilang pada proses pengeringan. Kulit Batang Banyuru (*Pterospermum celebicum*, Miq.) mengandung tanin (6), Polifenol, Terpenoid, Flavonoid. Pada profil KLT-densitometri (12), memakai eluen butanol:asam asetat:air (4:1:5) menunjukkan beberapa titik puncak yang hampir sama dari ketiga sampel yaitu, dengan eluen metanol:air (2:1), titik puncak yang sama, bahwa kesamaan profil ini menunjukkan pada ekstrak etanol asal Bantaeng, Malino dan Pare-Pare mengandung senyawa kimia identik yaitu senyawa flavonoid.dengan pembanding quersetin.Kadar Flavonoid Total yang terkandung dalam ekstrak etanol kulit batang Banyuru (*Pterospermum celebicum* Miq.) asal Bantaeng, Malino dan Pare-Pare. memakai metoda spektrofotometrk UV/Vis, dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengukuran Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol Banyuru (*Pterospermum celebicum* Miq.) Asal Bantaeng, Malino dan Pare-Pare.

Asal	Bobot Ekstrak (ppm)	Serapan (A)	Kadar Total Flavonoid (%)	Kadar rata-rata Flavonoid Total (%)
Bantaeng	500	0,651	1,099	1,100 ± 0,001
		0,651	1,099	
		0,652	1,100	
Malino	500	0,612	1,068	1,068 ± 0,001
		0,612	1,068	
		0,611	1,067	
Pare-Pare	500	0,603	1,046	1,046 ± 0,001
		0,602	1,045	
		0,603	1,046	

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan :

1. Penentuan organoleptik ekstrak, menunjukkan bahwa ekstrak etanol EKBB memiliki bau yang khas, bertekstur serbuk, berwarna coklat tua dan memiliki, ,rasa sepat dan pahit.
2. Kadar senyawa ekstrak yang terlarut dalam pelarut tertentu menunjukkan bahwa kadar senyawa ekstrak EKBB Bantaeng Kadar yang larut air 13,48% dan kisaran kadar senyawa larut etanol 1,84 %. kadar senyawa ekstrak EKBB asal Malino larut air 14,89% dan kisaran kadar senyawa yang larut etanol 3,61%. kadar senyawa ekstrak EKBB asal Para-Pare yang larut air 14,76% dan kadar senyawa larut etanol 1,05%.
3. Kandungan senyawa kimia ekstrak EKBB asal Bantaeng, Malino dan Pare-Pare merupakan senyawa golongan flavonoid.
4. Kadar Flavonoid total ekstrak EKBB Bantaeng adalah 1,10%, kandungan flavonoid ekstrak EKBB Malino yaitu 1,06% dan total kandungan flavonoid ekstrak EKBB Pare-Pare yaitu 1,05% sebagai kuersetin.
5. Profil KLT - Densitometri ekstrak EKBB, diperoleh senyawa yang muncul, pada spot yaitu spot 1, spot 2 dan spot 3.

SARAN

Perlu dilakukan uji kandungan total senyawa epikatecin, tanin, alkaloid, minyak menguap, asam prusid, dan triterpenoid untuk memperoleh data standar yang lengkap tentang EKBB.

DAFTAR PUSTAKA

1. Manitto, P. 1981. *Biosynthesis of Natural Product*. John Wiley & Sons New York
2. Robinson, T. 1991. *The Organic Constituents Of Higher Plants*, 6 th Edition Departement Of Biochemistry University of Massachusett , Amherst, MA 01003, 96-71.
3. Bisset, N. G. 1955. A phytochemical Survey Of Some Plants From The South Moluccas. Treub laboratory. Kebun Raya Bogor. 137.
4. Silbinol. S. C., 2000, A Rich Sources OF Polyphenolic Compounds Of Pterospermum marsupium, Phytochemistry Sabinsa Corporation, 70
5. Camporese , A., Balick, M.J., Arvigo, R., Esposito, R. G., Morsellino, N., De Simone, F, A. 2003. Screening Of Anti Bacterial Activity Of Medicinal Plants From Belize (Central America).Journal Of Ethnopharmacology 87(2003):103 – 107.
6. Stalikas, D.C. Extraction, Separation, and Detection Method for Phenolic Acid and Flavonoid. Journal Sep. Sci. 2007. Hal. 30, 3268-3295
7. Sossef, M. S., M.,Hong,L.T. and Prawirohatmodjo,S. 1998. Plant Resources of South - East Asia No 5 (3). Prosea Bogor Indonesia 479-482.
8. Saifudin, A., Rahayu, V., dan Teruna, HY. Standardisasi Bahan Obat Alam. Graha Ilmu. Jakarta. 2011. hal. 1-4, 69.
9. Departemen Kesehatan RI, (2000), Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat, Edisi I, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Bakti Husada, Jakarta, Hal.1-56, 18– 29
10. Hariyati, S. Standardisasi Ekstrak Tumbuhan Indonesia, Salah Satu Tahapan Penting Dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia. 2005. Available from: Majalah InfoPOM Volume 6 Nomor 4 Juli 2005. hal. 1-5.
11. Heyne,K,. Tumbuhan berguna Indonesia. Jilid III, Terjemahan oleh Balitbang Kehutanan. Yayasan Sarana Warna aya: Jakarta. 1987. Hal. 1352-1353.
12. Harborne, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Terjemahan oleh Padmawinata K & Soediro I. Bandung. Penerbit ITB. Hal. 120
13. Shukla, S.S., Swarnlata S., dan Shailendra S. TLC densitometric